

FATORES PROGNÓSTICOS DETERMINANTES NO TRATAMENTO EM PACIENTES PORTADORES DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E DOENÇA DE CHAGAS

Isaac F S Rodrigues¹, Augusto Cardinali-Neto², Reinaldo B Bestetti³

1- Acadêmico do curso de Medicina – FAMERP; 2- Médico Eletrofisiologista do Hospital de Base; 3- Docente do Curso de Cardiologia da FAMERP

Fontes de Financiamento: Bolsa de Iniciação Científica (BIC 2009/2010)

INTRODUÇÃO: A doença de Chagas, descrita por Chagas em 1909, é causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*, que é transmitido pelas fezes de vetores hematófagos, os conhecidos “bichos barbeiros”, comuns na América Latina e, no Brasil, majoritariamente representado pelo *Triatoma infestans*. Associado à Doença Chagásica temos a Hipertensão Arterial Sistêmica, patologia bastante prevalente em todo o mundo. Por isso, em nosso meio não é incomum indivíduos que sejam portadores dessas duas condições, Chagásicos hipertensos. **OBJETIVOS:** determinar se há correlação entre essas duas doenças que determine um melhor prognóstico, linhas no tratamento farmacológico e se indicações de interação na fisiopatologia das duas condições. **MÉTODOS:** através da análise de dados de prontuários do Hospital de Base e do seu Ambulatório, coletou-se dados clínicos e demográficos, do exame físico, de exames laboratoriais, de imagem, ecocardiográficos e eletrocardiográficos, e do tratamento farmacológico de pacientes chagásicos e chagásicos hipertensos para desenvolver uma análise estatística e determinar valores preditivos das variáveis. E por fim, através de curvas de Kaplan-Meier determinar fatores determinantes no prognóstico desses pacientes. **RESULTADOS:** Trezentos e cinquenta e três pacientes admitidos para acompanhamento no Ambulatório de Cardiomiopatia do Hospital de Base foram incluídos no estudo; 246 (70%) com Cardiomiopatia da doença de Chagas, e 107 (30%) com Cardiomiopatia Chagásica e Doença Hipertensiva, os dados de prontuário de todos esses pacientes foi distribuído e organizado em tabelas demonstrados os resultados das análises estatísticas e para facilitar o traçado das curvas de pior e melhor prognóstico de Kaplan-Meier. **CONCLUSÃO:** A Doença de Chagas ainda é uma patologia que aflige muitos pacientes em tratamento nos grandes centros hospitalares e universitários. Na análise desse estudo referenciado, o prognóstico mostra-se melhor quando associado com Hipertensão Arterial Sistêmica.