

Intervenções de enfermagem nas intercorrências dos pacientes renais crônicos durante a hemodiálise

Karina Yamamoto¹, Natália F Cruzeiro¹, João Fernando P Oliveira², Maria Helena Pinto³, Rita de Cássia H. M. Ribeiro³, Claudia B. Cesarino³

1- Acadêmica do Curso de Enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP; 2- Médico Nefrologista da Fundação Regional de Medicina de São José do Rio Preto - FUNFARME; 3- Professora Doutora do Departamento de Enfermagem Geral da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP

Fontes de Financiamento: Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC 2009/2010)

Introdução: Os pacientes renais crônicos podem apresentar inúmeras complicações durante hemodiálise (HD) e a equipe de enfermagem tem fundamental importância na observação contínua desses pacientes, podendo salvar vidas e evitar as complicações a partir de um diagnóstico precoce das intercorrências. **Objetivos:** Identificar as intercorrências dos pacientes renais crônicos durante a HD, de acordo com suas variáveis sócio-demográficas e analisar as intervenções de enfermagem. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal realizado com 195 pacientes renais crônicos que apresentaram intercorrências durante HD no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados um formulário de observação sistematizada e uma entrevista semi-estruturada. A análise dos dados foi norteada por análise estatística descritiva, com aplicação do Teste 't' para amostras independentes, teste 't' pareado; teste de análise de variância (ANOVA) e teste qui-quadrado. **Resultados:** Em relação ao perfil sócio demográfico dos pacientes renais crônicos foram: 57,95% sexo masculino, com idade média de 57,13±15,34 anos, 53,85% casados, 51,28% aposentados, 74,36% católicos, 77,95% de cor branca e 61,03% possuíam ensino fundamental incompleto. As intercorrências encontradas foram: 40,88% hipotensão, 14,70% dor e 11,16% cefaléia e as condutas mais realizadas foram: 43,24% administração de medicação, 33,05% de soro e 7,40% administração de soro e diminuição da ultrafiltração. **Conclusão:** Os resultados deste estudo quanto intervenções de enfermagem nas intercorrências dos pacientes renais crônicos durante a hemodiálise estão em concordância com estudos brasileiros e oferecerão subsídios para garantir a qualidade da assistência de enfermagem e segurança destes pacientes.