

57. PREVALÊNCIA DE ÚLCERA POR PRESSÃO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM UM HOSPITAL ESCOLA

Aguiar JC¹; Rodrigues CDS²

¹Enfermeiro, Gerente da Unidade Básica de Saúde da Família Drº Antonio Abdalla – Município de Potirendaba, Professor do Curso técnico de enfermagem do colégio Uniterp

²Docente do curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto- FAMERP

Introdução: Úlceras por pressão são freqüentes em pacientes críticos aumentando tempo de internação e custos, causam dor, desconforto, interferindo na qualidade de vida. Objetivo: determinar a prevalência de UP em pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva. metodologia: estudo descritivo exploratório, observacional para a geração de hipóteses sobre a associação de fatores de risco e desenvolvimento de UP. Resultados: A amostra foi composta por 127 clientes da UTI Clínica, sendo 64 do sexo masculino e 63 do sexo feminino; 10,24% dos pacientes do sexo masculino e 6,30% das clientes do sexo feminino apresentaram UP durante a internação; Os pacientes da UTI da Cirurgia totalizaram 124, sendo 83 homens e 41 mulheres; 6,5% dos pacientes do sexo masculino e 3,22% das pacientes do sexo feminino apresentaram UP. Conclusão: A prevalência de UP foi menor comparada a dados da literatura, o que sugere um maior envolvimento dos profissionais, refletindo positivamente na prática clínica e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos clientes observados.