

42. AVALIAÇÃO DAS INDICAÇÕES DE CERATOPLASTIA PENETRANTE NO INTERIOR PAULISTA

Amanda P Barbosa¹; Marta F Teixeira²; José Carlos Barbosa³; Gildásio C de Almeida Junior⁴

¹Acadêmica do Curso de Medicina da FAMERP; ²Professora Assistente do Departamento de Especialidades Cirúrgicas da disciplina de Oftalmologia da FAMERP; ³Professor Titular do Departamento de Ciências Exatas da UNESP; ⁴Oftalmologista da Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto

Financiamento: Bolsa de Iniciação Científica - FAMERP

Introdução: A Ceratoplastia Penetrante (CP) geralmente é a cirurgia de escolha na reabilitação dos pacientes com cegueira provocada por doenças corneanas. Entretanto, a prevalência destas patologias difere entre as populações, fato que, associado à frequência ascendente da CP e ao seu êxito, torna relevante a análise de suas principais indicações, e sua comparação com fatores como idade, sexo e nível socioeconômico. **Objetivos:** Determinar as indicações de CP de pacientes transplantados no Hospital de Base de São José do Rio Preto, correlacionando-os com faixa etária, sexo e situação socioeconômica. **Materiais e Métodos:** Análise retrospectiva de 1085 fichas de inscrição de pacientes submetidos à CP, no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no período de 2000 a 2009. Os diagnósticos para indicação das cirurgias foram posteriormente correlacionados com a faixa etária, o sexo e o nível sócio econômico, por meio do teste do Qui quadrado. **Resultados:** Do total de CPs, 57,4% foram realizadas em pacientes do sexo masculino, com uma média de idade de 52,3 anos. Verificou-se que em 90,8% dos casos a cirurgia ocorreu por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). A indicação mais frequentemente encontrada foi o leucoma (23%), o qual foi responsável por 14% das cirurgias ocorridas em homens e em 9% das promovidas em mulheres. Em relação às ceratoplastias por este diagnóstico, 40% foram realizadas em pacientes com idade superior a 60 anos, com porcentagem decrescendo com as faixas etárias mais jovens, e 94,4% efetuaram-se através do SUS. **Conclusão:** A principal indicação à CP foi o leucoma, o qual predominou em homens, nas idades acima de 60 anos, em pacientes do SUS.