INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NO EXTRAVASAMENTO TISSULAR DE QUIMIOTERÁPICOS ANTINEOPLÁSICOS VESICANTES

Ana Maria Feltrin Marino¹; João Júnior Gomes²

¹Enfermeira pós-graduanda em Enfermagem em Oncologia pela FAMERP; ²Doutorando em Ciências da Saúde e Coordenador da pós-graduação Enfermagem em Oncologia pela FAMERP

Sabe-se que não estão totalmente excluídos os riscos de extravasamento local quando o paciente é submetido ao tratamento antineoplásico vesicante, mesmo quando é procedido por profissionais qualificados e treinados. Por ser de grande relevância para a assistência de enfermagem aos pacientes oncológicos, buscou-se identificar os sinais e sintomas apresentados após extravasamento de droga quimioterápica antineoplásica vesicante e propor intervenções de enfermagem segundo a *Nursing Outcomes Classification* – NIC. Realizou-se uma busca na Literatura Científica Brasileira incluindo os artigos, livros e teses da USP. Os artigos selecionados foram a partir da biblioteca Virtual em Saúde em Ciências de Saúde em Geral nas bases de dados: LILACS, IBICS, MEDLINE, SciELO. Para a seleção dos artigos foram inclusos os critérios: estudos publicados na íntegra com os seguintes descritores: extravasamento de materiais terapêuticos e diagnósticos e fármacos antineoplásicos. Os estudos que não atenderam aos critérios de inclusão, não foram selecionados. Para os levantamentos bibliográficos que foram extraídos de livros e teses, focou-se apenas trechos dos sinais e sintomas apresentados após extravasamento local de quimioterápicos antineoplásicos vesicantes. Os resultados demonstraram que os sinais e sintomas mais frequentes apresentados nesta situação foram: dor local, edema, eritema, úlceras queimaduras, inflamações, lesão tecidual, formações de vesículas, necrose e amputação de membros. Para a *Nursing Outcomes Classification* (NIC) as intervenções sugeridas para cada situação identificadas foram: Controle da DOR, Supervisão da PELE, Aplicação de CALOR/FRIO, Cuidados com LESÕES, Irrigação de LESÕES, Cuidados na AMPUTAÇÃO. Conclui-se que a identificação dos sinais e sintomas mais frequentes e sugestão de intervenções segundo a NIC demonstra uma preocupação com a qualidade do cuidado fundamentado em evidência científica na enfermagem.